¿La Diocalandra está teniendo afección significativa en los palmerales naturales o está principalmente concentrada en las palmeras urbanas?

En la actualidad, *Diocalandra frumenti* está presente en todas las islas del archipiélago canario, excepto en El Hierro y La Graciosa. Las palmeras urbanas están gravemente afectadas por esta plaga y, además, por hongos fitopatógenos que agravan su estado. Sin embargo, *D. frumenti* también afecta significativamente a los palmerales naturales de Gran Canaria, especialmente en barrancos del sur-suroeste, como Mogán, Arguineguín, Ayagaures y Fataga, y en otras áreas como Los Corralillos (Agüimes), Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria) y Arucas. En 2018, palmerales emblemáticos como El Aserradero, Arteara, Ayagaures y Gambuesas estaban gravemente afectados, y más recientemente, se ha confirmado su presencia en el palmeral de Guguy Grande, en La Aldea de San Nicolás, gracias a una prospección realizada dentro del proyecto LIFE Phoenix.

Esta problemática, junto con otras amenazas como los incendios forestales, las especies exóticas invasoras, la hibridación y degradación del hábitat, ha llevado a la creación del proyecto LIFE Phoenix. Este proyecto pretende implementar metodologías innovadoras para minimizar los riesgos que enfrentan los palmerales europeos, incluidos en el hábitat prioritario 9370* “Palmerales de Phoenix”, asegurando así su conservación y sostenibilidad a largo plazo. Además, incluye acciones específicas como monitoreo, control biológico y medidas de prevención para abordar estas amenazas. Puedes encontrar más información sobre estas acciones en https://lifephoenix.gesplan.es/es.